



# ESOXX<sup>®</sup> ONE

**W POLSKICH WYTYCZNYCH POSTĘPOWANIA Z GERD**

**JEDYNY UNIKALNY PRODUKT, KTÓRY DZIĘKI NOŚNIKOWI TERMOADHEZYJNEMU POLOXAMER 407 TWORZY BARIERĘ OCHRONNĄ W PRZEŁYKU**

**UNIKALNY  
PRODUKT**

**ESOXX<sup>®</sup> ONE**

**DZIAŁA TAM,  
GDZIE POWSTAJĄ  
PRZEŁYKOWE  
OBJAWY REFLUKSU  
I NA POZAPRZEŁYKOWY  
ZESPÓŁ KASZLOWY\***

**SKUTECZNOŚĆ  
POTWIERDZONA  
BADANAMI  
KLINICZNYMI**

**IPP, H<sub>2</sub> BLOKERY  
ALGINIANY  
ZOBOJĘTNIAJĄCE  
OSŁONOWE**



**Do stosowania u pacjentów:**

- cierpiących pomimo stosowania leków – jako **terapia dodana**<sup>1</sup>,
- w okresie odstawienia leków – jako **terapia pomostowa**.



**Szybko\*\* znosi objawy refluksu (np: zgagę, regurgitację)<sup>2</sup>.**



**Jedyny unikalny produkt zawierający kwas hialuronowy, który dzięki poloxamerowi 407 tworzy barierę ochronną w przełyku.**



**Chroni śluzówkę przełyku przed zgagą<sup>3</sup> i przyspiesza jej gojenie.**


WSKAZANIA: ESOXX<sup>®</sup> ONE to wyrób medyczny o działaniu miejscowo-osłaniającym, który pozwala na szybkie złagodzenie objawów związanych z refluksiem żołądkowo-przełykowym, takich jak zgaga, ból w nadbrzuszu, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, kaszel podrażnieniowy, dysfonia (chrypka). Choroba refluksowa przełyku charakteryzuje się objawami takimi jak zgaga, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, kaszel podrażnieniowy, dysfonia, które mogą, choć nie muszą, być powiązane z występowaniem zapalnych zmian nadnerkowych błony śluzowej przełyku. Objawy GERD są zazwyczaj bardziej odczuwalne w pozycji leżącej i mogą nasilać się w trakcie snu. ESOXX<sup>®</sup> ONE to połączenie kwasu hialuronowego i siarczanu chondroitynu, które ze względu na swój oryginalny i innowacyjny mechanizm działania chronią błonę śluzową przełyku. ESOXX<sup>®</sup> ONE zawiera także poloxamer 407 – składnik o wysokiej zdolności przylegania do błony śluzowej przełyku. Dzięki niemu kwas hialuronowy i siarczan chondroitynu dłużej powlekają śluzówkę, chroniąc ją przed działaniem kwasu solnego wytwarzanego w żołądku. Siarczan chondroitynu ma również działanie wspomagające w procesie gojenia błony śluzowej przełyku. SKŁAD: Kwas hialuronowy, siarczan chondroitynu, poliwinylopirolidon, ksylitol C, benzenoesan sodu, sorbinian potasu, aromaty, woda demineralizowana, poloxamer 407. OPAKOWANIE: 14 ESOXXetek (saszetek jednodawkowych) po 10 ml. DAWKOWANIE I SPOSOB UŻYCIA: 1 ESOXXetka (pojedyncza saszetka) 10 ml po głównych posiłkach i/lub przed snem lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Końcówkę saszetki należy odciąć nożyczkami lub odcwać w miejscu przeznaczonym przerywaną linią. Syrop można wypić bezpośrednio z saszetki. Syrop nie wymaga rozcieńczenia. PRZECIWSKAZANIA: Brak jest szczególnych przeciwwskazań, z wyjątkiem przypadków nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W takiej sytuacji należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Pomimo że nie są znane działania niepożądane, nie zaleca się stosowania ESOXX<sup>®</sup> ONE w okresie ciąży lub w pierwszych miesiącach karmienia. W każdym przypadku należy najpierw skonsultować się z lekarzem. OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od brzoideł ciepła. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. WYTWÓRCA: Aphaarm srl, via Roma 26, 28041 Arona, Włochy. DYSTRYBUTOR: Alfasciga Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; tel.: +48 22 8240364.

\* Związany z niskim pH w przełyku. \*\* U większości pacjentów (>60%) Esoxx<sup>®</sup> One rozpoczyna swoje działanie poniżej 30 min od zastosowania.

1. Savarino et al. Aliment. Pharmacol. Ther. 2017 Mar; 45(5):631-642. 2. Palmieri B et al. Eur Rev Med Pharmacol 2013; 17:3272-3278. 3. Di Simone MP et al. Clin Expt Gastroenterol 2012; 5:103-107.


# ALGORYTMY SCHEMAT POSTĘPOWANIA W GERD 2019\*

Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z typowymi objawami choroby refluksowej przełyku (GERD)



PPI – inhibitory pompy protonowej, OTC – leki dostępne bez recepty, BMI – wskaźnik masy ciała, WHR – stosunek obwodu talii do obwodu bioder, NERD – nonerosive reflux disease, EE C/D – nadżerkowe zapalenie przełyku stopnia C/D, BE – przełyk Barretta

Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z podejrzeniem pozaprzelykowych objawów choroby refluksowej przełyku (GERD)



RTG – badanie rentgenowskie, PPI – inhibitory pompy protonowej

\* Gąsiorowska A et al. Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Lekarz POZ 2019; 3–4:252–253.