



ESOXX[®] ONE

dla pacjentów cierpiących
**z powodu zgagi
i regurgitacji**



Do stosowania u pacjentów:

- cierpiących pomimo stosowania leków – jako **terapia dodana**,
- w okresie odstawienia leków – jako **terapia pomostowa**.



Szybko* znosi objawy refluksu
(np: zgagę, regurgitację...)¹.




Jedyny zawierający kwas hialuronowy,
który działa w przetyku¹.



Chroni śluzówkę przetyku przed zgagą
i przyspiesza jej gojenie^{1,3}.



ALFASIGMA





ESOXX® ONE

dla pacjentów cierpiących
z powodu **zgagi**
i **regurgitacji**

- ESOXX® ONE szybko* i długotrwale** znosi objawy refluksu¹.
- ESOXX® ONE dodany do IPP jest skuteczniejszy niż sam IPP w kontrolowaniu objawów, takich jak **zgaga i regurgitacja** u pacjentów z NERD².
- ESOXX® ONE posiada dobry profil bezpieczeństwa i tolerancji oraz dobry smak w ocenie pacjentów².
- ESOXX® ONE dodany do IPP pozwala osiągnąć jakość życia zbliżoną do populacji osób zdrowych².

WSKAZANIA: ESOXX® ONE to wyrób medyczny o działaniu miejscowo-osłaniającym, który pozwala na szybkie złagodzenie objawów związanych z refluksiem żołądkowo-przełykowym, takich jak zgaga, ból w nadbrzuszu, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, kaszel podrażnieniowy, dysfonia (chrypka).

Choroba refluksowa przełyku charakteryzuje się objawami takimi jak zgaga, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, kaszel podrażnieniowy, dysfonia, które mogą, choć nie muszą, być powiązane z występowaniem zapalnych zmian nadżerkowych błony śluzowej przełyku. Objawy GERD są zazwyczaj bardziej odczuwalne w pozycji leżącej i mogą nasilać się w trakcie snu.

ESOXX® ONE to połączenie kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny, które ze względu na swój oryginalny i innowacyjny mechanizm działania chronią błonę śluzową przełyku. ESOXX® ONE zawiera także poloxamer 407 – składnik o wysokiej zdolności przylegania do błony śluzowej przełyku. Dzięki niemu kwas hialuronowy i siarczan chondroityny dłużej powlekają śluzówkę, chroniąc ją przed działaniem kwasu solnego wytwarzanego w żołądku. Siarczan chondroityny ma również działanie wspomagające w procesie gojenia błony śluzowej przełyku.

SKŁAD: Kwas hialuronowy, siarczan chondroityny, poliwinylopirolidon, ksylitol C, benzoetan sodu, sorbinian potasu, aromaty, woda demineralizowana, poloxamer 407.

OPAKOWANIE: 14 ESOXXetki (saszetki jednodawkowych) po 10 ml.

DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA: 1 ESOXXetka (pojedyncza saszetka) 10 ml po głównych posiłkach i/lub przed snem lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Końcówkę saszetki należy odciąć nożyczkami lub oderwać w miejscu zaznaczonym przerywaną linią. Syrop można wypić bezpośrednio z saszetki. Syrop nie wymaga rozcieńczania.

PRZECIWSKAZANIA: Brak jest szczególnych przeciwwskazań, z wyjątkiem przypadków nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W takiej sytuacji należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Pomimo że nie są znane działania niepożądane, nie zaleca się stosowania ESOXX® ONE w okresie ciąży lub w pierwszych miesiącach karmienia. W każdym przypadku należy najpierw skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródła ciepła. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WYTWÓRCA: Aphaarm srl, via Roma 26, 28041 Arona, Włochy

DYSTRYBUTOR: Alfaisigma Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; tel.: +48 22 8240364

Informacje o produkcie i jego mechanizmie działania dostępne na stronie: www.esoxxone.pl

Sprawdź również nasz fanpage: www.facebook.com/Aga.Zgaga.Esoxxone

1. Palmieri B et al. Eur Rev Med Pharmacol 2013; 17:3272-3278. 2. Savarino V. et al Randomised clinical trial: mucosal protection combined with acid suppression in the treatment of non-erosive reflux disease – efficacy of Esoxx, a hyaluronic acid-chondroitin sulphate based bioadhesive formulation. Aliment. Pharmacol. Ther. 2017 Mar; 45(5):631-642. 3. Di Simone MP et al. Clin. Expt. Gastroenterol. 2012; 5:103-107.

*60% pacjentów deklaruje szybki początek działania ≤30 min.

**60% pacjentów deklaruje utrzymanie efektu skutecznego działania powyżej 3 godzin po zażyciu Esoxx® One.