



ESOXX[®] ONE

W POLSKICH WYTYCZNYCH POSTĘPOWANIA Z GERD
JEDYNY UNIKALNY PRODUKT, KTÓRY DZIĘKI NOŚNIKOWI TERMOADHEZYJNEMU
POLOXAMER 407 TWORZY BARIERĘ OCHRONNĄ W PRZEŁYKU

**UNIKALNY
PRODUKT**

ESOXX[®] ONE

DZIAŁA TAM,
GDZIE POWSTAJĄ
PRZEŁYKOWE
OBJAWY REFLUKSU,
I NA POZAPRZEŁYKOWY
ZESPÓŁ KASZLOWY*

**SKUTECZNOŚĆ
POTWIERDZONA
BADANAMI
KLINICZNYMI**

IPP, H₂ BLOKERY
ALGINIANY
ZOBOJĘTNIAJĄCE
OSŁONOWE



- Do stosowania u pacjentów:
 - cierpiących pomimo stosowania leków – jako **terapia dodana**¹,
 - w okresie odstawienia leków – jako **terapia pomostowa**.
- Szybko** znosi objawy refluksu (np: zgagę, regurgitację)².
- Jedyny unikalny produkt zawierający kwas hialuronowy, który dzięki poloxamerowi 407 tworzy barierę ochronną w przełyku.
- Chroni śluzówkę przełyku przed zgagą³ i przyspiesza jej gojenie.


WSKAZANIA: ESOXX[®] ONE to wyrób medyczny o działaniu miejscowo-osłaniającym, który pozwala na szybkie złagodzenie objawów związanych z refluksiem żołądkowo-przełykowym, takich jak zgaga, ból w nadbrzuszu, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, kaszel podrażnieniowy, dysfonia (chrypka). Choroba refluksowa przełyku charakteryzuje się objawami takimi jak zgaga, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku, kaszel podrażnieniowy, dysfonia, które mogą, choć nie muszą, być powiązane z występowaniem zapalnych zmian nadżerkowych błony śluzowej przełyku. Objawy GERD są zazwyczaj bardziej odczuwalne w pozycji leżącej i mogą nasilać się w trakcie snu. ESOXX[®] ONE to połączenie kwasu hialuronowego i siarczanu chondroitynu, które ze względu na swój oryginalny i innowacyjny mechanizm działania chronią błonę śluzową przełyku. ESOXX[®] ONE zawiera także poloxamer 407 – składnik o wysokiej zdolności przylegania do błony śluzowej przełyku. Dzięki niemu kwas hialuronowy i siarczan chondroitynu dłużej powlekają śluzówkę, chroniąc ją przed działaniem kwasu solnego wytwarzanego w żołądku. Siarczan chondroitynu ma również działanie wspomagające w procesie gojenia błony śluzowej przełyku. SKŁAD: Kwas hialuronowy, siarczan chondroitynu, poliwinylopirolidon, ksylitol C, benzoan sodu, sorbinian potasu, aromaty, woda demineralizowana, poloxamer 407. **OPAKOWANIE:** 14 ESOXXetek (saszetek jednodawkowych) po 10 ml. **DAWKOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA:** 1 ESOXXetka (pojedyncza saszetka) 10 ml po głównych posiłkach i/lub przed snem lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Końcówkę saszetki należy odciąć nożyczkami lub oderwać w miejscu zaznaczonym przerywaną linią. Syrop można wypić bezpośrednio z saszetki. Syrop nie wymaga rozcieńczenia. **PRZECIWWSKAZANIA:** Brak jest szczególnych przeciwwskazań, z wyjątkiem przypadków nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W takiej sytuacji należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem. Pomimo że nie są znane działania niepożądane, nie zaleca się stosowania ESOXX[®] ONE w okresie ciąży lub w pierwszych miesiącach karmienia. W każdym przypadku należy najpierw skonsultować się z lekarzem. **OSTRZEŻENIA:** Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. WYTWÓRCA: Apharm srl, via Roma 26, 28041 Arona, Włochy. DYSTRYBUTOR: Alfagima Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa; tel.: +48 22 8240364.

* Związany z niskim pH w przełyku. ** U większości pacjentów (>60%) Esoxx[®] One rozpoczyna swoje działanie poniżej 30 min od zastosowania.

1. Savarino V et al. Aliment. Pharmacol. Ther. 2017 Mar; 45(5):631-642. 2. Palmieri B et al. Eur. Rev. Med. Pharmacol. 2013; 17:3272-3278. 3. Di Simone MP et al. Clin. Expt. Gastroenterol. 2012; 5:103-107.


ALGORYTMY – SCHEMAT POSTĘPOWANIA W GERD 2019*

Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z typowymi objawami choroby refluksowej przełyku (GERD)



PPI – inhibitory pompy protonowej, OTC – leki dostępne bez recepty, BMI – wskaźnik masy ciała, WHR – stosunek obwodu talii do obwodu bioder, NERD – nonerosive reflux disease, EE C/D – nadżerkowe zapalenie przełyku stopnia C/D, BE – przełyk Barretta

Algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z podejrzeniem pozaprzętkowych objawów choroby refluksowej przełyku (GERD)



RTG – badanie rentgenowskie, PPI – inhibitory pompy protonowej